




COSTA RICA

VADEMECUM





Medicamentos
**PARA TODA
LA FAMILIA**

LABORATORIOS




INFARMA





ÍNDICE DIGESTIVOS

Colicort.....	4
D-Gesplen	5
Diacort.....	6
Picolax	7
Simflat	8



COLICORT

DIGESTIVOS



COMPOSICIÓN.

- Metilbromuro de Homatropina 20 mg
- Vehículo c.s.p 100 mL

INDICACIONES.

- Espasmos del conducto gastrointestinal

POSOLÓGIA.

- 2 gotas / Kg de peso / dosis tres o cuatro veces al día



UN MUNDO DE CALIDAD

D-GESPLEN

DIGESTIVOS



COMPOSICIÓN:

- Amilasa 2000 SKB
- Lipasa 450 FIP
- Proteasa 2500 HUT
- Vitamina B6: 0,400mg

POSOLOGÍA:

- Abrir una o dos cápsulas y disolver el contenido en 15mL de agua, tomar con cada tiempo de comida.
- Consumo máximo de 6 cápsulas al día.
- Delicioso sabor a fresa.



COMPOSICIÓN:

- Cada cápsula de origen vegetal (naturales) contiene:
- Amilasa 2000 SKB
- Lipasa 450 FIP
- Proteasa 2500 HUT
- Vitamina B6: 0,400mg

POSOLOGÍA:

- Tomar de 1 a 2 cápsulas con cada comida.
- Consumo máximo diario 6 cápsulas.



UN MUNDO DE CALIDAD

DIACORT

DIGESTIVOS



COMPOSICIÓN.

- Nifuroxazida400 mg
- Vehículo c.s.p.....1 cápsula

INDICACIONES.

- Antiséptico intestinal con acción bactericida local de amplio espectro.
- Tratamiento de la diarrea aguda bacteriana.

POSOLÓGIA.

- Niños mayores de 12 años y adultos: 1 cápsula cada 12 horas. En casos agudos: 1 cápsula cada 8 horas.



COMPOSICIÓN.

- Nifuroxazida200mg
- Vehículo c.s.p.....5mL

INDICACIONES.

- Antiséptico intestinal con acción bactericida local de amplio espectro.
- Tratamiento de la diarrea aguda bacteriana.

POSOLÓGIA.

- De 1 mes a 6 años 10 mg/kg cada 8 horas, Niños de 6 a 12 años 5 mL cada 6 horas, Niños mayores de 12 años y adultos 1 a 2 cucharaditas cada 6 horas.



UN MUNDO DE CALIDAD

PICOLAX

DIGESTIVOS



COMPOSICIÓN.

- Picosulfato de Sodio..... 12,5 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Estreñimiento de diversos orígenes como:
 - Pacientes encamados.
 - Deshidratación.
 - Hemorroides.
- Preparación para endoscopías.
- Distensión intestinal y siempre que sea conveniente la defecación sin esfuerzo.

POSOLÓGIA.

- Niños de 1 a 2 años: 1 a 2 gotas por noche.
- Niños de 2 a 10 años: 2 a 5 gotas por noche.
- Adultos: de 8 a 12 gotas por noche.



UN MUNDO DE CALIDAD

SIMFLAT

DIGESTIVOS



COMPOSICIÓN.

- Hidróxido de Aluminio.....200 mg
- Hidróxido de Magnesio.....200 mg
- Simeticona USP.....25 mg

INDICACIONES.

• Asociación binaria de dos antiácidos, hidróxido de aluminio y de hidróxido de magnesio, que neutralizan el exceso de iones ácidos a nivel del saco estomacal, con esto se eliminan la hiperacidez y las sensaciones de llenura y quemazón, en el tracto digestivo superior. SINFLAT contiene en su formulación, además, simeticona, un antiespumante que adsorbe los gases del bicarbonato que se liberan de la reacción del ácido clorhídrico con los hidróxidos de SINFLAT. Esa interacción de la simeticona produce que se eliminen los eructos y la sensación de vómito

POSOLOGÍA.

- Se recomienda masticar una o dos tabletas tres veces al día, después de las comidas principales.





UN MUNDO DE CALIDAD



ÍNDICE MUSCULAR

Denalgex.....	10
Flexigel.....	11
Lactiof Plus.....	12
Reflex.....	13





DENALGEX

MUSCULAR



COMPOSICIÓN.

- Dexketoprofeno 25 mg (equivale a 36,9 mg de Dexketoprofeno trometamol)
- Excipientes c.s.p. 10 mL

INDICACIONES.

- Tratamiento sintomático del dolor, de intensidad leve a moderado, tal como: dolor músculo-esquelético, dismenorrea, odontalgias.

POSOLÓGÍA.

- Adultos: 1 sachet (25mg), 3 veces al día.
- Edad avanzada: 1 sachet (25mg), 2 veces al día.



 Con sabor a Cereza



UN MUNDO DE CALIDAD



FLEXIGEL

MUSCULAR



COMPOSICIÓN.

- Dexketoprofeno 1,25%

INDICACIONES.

- Dolor o inflamación causada por afecciones traumáticas o degenerativas de los músculos, articulaciones y ligamentos.

POSOLÓGÍA.

- Aplicar 2-3 veces al día en la zona afectada



UN MUNDO DE CALIDAD

LACTIOF PLUS

MUSCULAR



COMPOSICIÓN.

- Tiocolchicósido..... 4 mg
- Diclofenaco potásico..... 50 mg
- Excipientes c.s.p..... 1 tableta

INDICACIONES.

- Contracturas musculares dolorosas, como: tortícolis, lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia.
- Analgésico.
- Antiinflamatorio.

POSOLÓGIA.

- Mayores de 16 años, 1 a 2 tabletas cada 12 horas por un período máximo de 7 días.



UN MUNDO DE CALIDAD

REFLEX

MUSCULAR



COMPOSICIÓN.

- Salicilato de Metilo 4 g
- Mentol 1,5 g
- Alcanfor 150 mg
- Vehículo c.s.p 100 g

INDICACIONES.

- Elimina dolores musculares.

POSOLÓGIA.


- Aplicar en la zona afectada las veces que sea necesario.



UN MUNDO DE CALIDAD

ÍNDICE TÓPICOS

Acuntio.....	15
Alergical.....	16
Alergical DL.....	17
Dermaloe.....	18
Fusion-A	19
Hongo Derm.....	20
Infaderm	21
Upin	22



ACUNTIO

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Tioconazol nitrato..... 10 mg
- Vehículo c.s.p..... 1 g

INDICACIONES.

- Infecciones de la piel.
- Pie de atleta.
- Dermatofitos.
- Candidiasis.
- Levaduras.
- Pitiriasis versicolor.

POSOLOGÍA.

- Aplicar 2 veces al día sobre la zona afectada.



COMPOSICIÓN.

- Tioconazol nitrato..... 10 mg
- Vehículo c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES.

- Infecciones de la piel.
- Pie de atleta.
- Dermatofitos.
- Candidiasis.
- Levaduras.
- Pitiriasis versicolor.

POSOLOGÍA.

- Aplicar 2 veces al día sobre la zona afectada.



UN MUNDO DE CALIDAD

ALERGICAL

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Calamina: 80 mg
- Óxido de Zinc: 80 mg
- Difenhidramina HCl: 10 mg
- Lidocaína HCl: 20 mg
- Vehículo c.s.p: 1 g

INDICACIONES.

- Calma la alergia, ardor y otras molestias producidas por:
 - Quemaduras de sol - Varicela.
 - Pañalitis - Picaduras de insectos
 - Sarampión

POSOLÓGIA.

- Frecuencia de uso: aplicar en la zona afectada 3 o 4 veces al día.



COMPOSICIÓN.

- Calamina: 80 mg
- Oxido de Zinc: 80 mg
- Difenhidramina HCl: 10 mg
- Lidocaína HCl: 20 mg
- Vehículo c.s.p: 1 g

INDICACIONES.

- Calma la alergia, ardor y otras molestias producidas por:
 - Quemaduras de sol - Varicela.
 - Pañalitis - Picaduras de insectos
 - Sarampión

POSOLÓGIA.

- Frecuencia de uso: aplicar en la zona afectada 3 o 4 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

ALERGICAL DL

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Difenhidramina HCl.....10 mg
- Lidocaína HCl.....8 mg
- Vehículo c.s.p.....1 g

INDICACIONES.

- Calma la alergia, ardor y otras molestias producidas por quemaduras de sol, picaduras de insectos y sarpullido.

POSOLÓGIA.

- Uso pediátrico en niños mayores de 2 años y adultos, aplicar de 3 a 4 veces al día sobre la zona afectada.



UN MUNDO DE CALIDAD

DERMALOE

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Extracto liofilizado de Aloe vera.....0,20 g
- Vehículo c.s.p.....100 g

INDICACIONES.

- Para el tratamiento de heridas, úlceras, quemaduras, radiodermis y otras irritaciones e inflamaciones de la piel, psoriasis, acné, manchas faciales durante el embarazo (melasma gravídico).

POSOLOGÍA.

- Aplicar sobre la piel la cantidad necesaria, puede utilizarse en cicatrices, pieles secas y dañadas, quemaduras de sol, irritaciones y pequeñas quemaduras.



COMPOSICIÓN.

- Extracto liofilizado de Aloe vera2 g
- Vehículo c.s.p. 100 g

INDICACIONES.

- Regeneración de tejido y alivio de lesiones provocadas por psoriasis.

POSOLOGÍA.

- Aplicar en la zona afectada, dos veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

FUSION-A

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Ácido fusídico.....2%

INDICACIONES.

- Infecciones cutáneas superficiales en lactantes, niños y adultos, tales como impétigo, dermatosis, forunculosis y de todas aquellas que sean sensibles al medicamento.

POSOLÓGIA.

- Aplicar 2-3 veces al día sobre la zona afectada, por 7 a 10 días.



UN MUNDO DE CALIDAD

HONGO DERM

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

Miconazol Nitrato.....2 g
Vehículo c.s.p..... 100 g

INDICACIONES.

- Infecciones de la piel.
- Pie de atleta.
- Tiña en cabeza.
- Tiña en ingles.
- Pitiriasis versicolor.

POSOLÓGIA.

- Aplicar sobre la zona afectada 2 o 3 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

INFADERM

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Estearato de Zinc.....50 mg
- Vehículo emoliente c.s.p.....1 g

INDICACIONES.

- Irritaciones causadas por:
Pañales.
Jabones.
Detergentes.
Agentes físicos.
Agentes químicos (lacas, solventes).
Agrietamiento de la piel y pezones.

POSOLÓGIA.

- Aplicar en capa fina, las veces que sea necesario.



UN MUNDO DE CALIDAD

UPIN

TÓPICOS



COMPOSICIÓN.

- Tioconazol300 mg
- Ácido salicílico.....20 mg
- Ácido undecilénico 100 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Infecciones fúngicas de las uñas producidas por dermatofitos como *Epidermophyton* spp., *Trichophyton* spp., *Microsporum* spp y levaduras como *Candida albicans*.

POSOLÓGIA.

- Pincelar una o dos veces al día sobre la uña afectada.



UN MUNDO DE CALIDAD

ÍNDICE RESPIRATORIOS

Broncatar.....	24
Bucalex.....	25
Corinfar	26
Corisan	27
Corisan	28
Dopresol	29
Febrin.....	30
Fisionasal.....	31
Flogobron-S	32
Infarup	33
Levinfar	34
Mucisol	35
Mucisol compuesto	36
Pentatox	37
Perebron.....	38
Prilon.....	39
Zinparin.....	40



BRONCATAR

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

Cada 100 g contiene:

Aceite Esencial Eucalyptus globulus ..	10 g
Aceite Esencial Mentha piperita.....	1 g
Vehículo c.s.p.....	100 g

INDICACIONES.

- Coadyuvante en el alivio de los síntomas de tos y resfriados.
- Alivio local de dolores musculares.

POSOLOGÍA.

- Uso tópico: Niños entre 2 y 12 años, adolescentes, adultos y ancianos: usar sobre piel intacta, aplicar una fina capa del producto en el pecho o espalda 2 o 3 veces al día. No aplicar por más de una semana.
- Inhalaciones: Niños mayores de 12 años y adultos: utilizar una cucharadita (5g) en el vaporizador y hacer inhalaciones 2-3 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

BUCALEX

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Cetilpiridinio HCl 2 mg
- Hidrocortisona, Acetato 0,6 mg
- Benzocaína 20 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Dolor de garganta y molestias al tragar.
- Coadyuvante en el tratamiento de amigdalitis, faringitis y laringitis.
- Desinflama y tiene efecto antiséptico.

POSOLÓGIA.

- Niños de 6 a 12 años: 1 aplicación tres veces al día.
- Adultos: 2 aplicaciones cada 6 a 8 horas



UN MUNDO DE CALIDAD

CORINFAR

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Acetaminofén 100 mg
- D-Clorfeniramina maleato 0,5 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Alivio rápido de la congestión, goteo nasal (rinorrea) y otros síntomas asociados a los resfriados, rinitis alérgica y otras alergias de vías respiratorias superiores.
- Reduce la fiebre y dolores musculares frecuentemente asociados con los resfriados.

POSOLÓGIA.

- Menores de 2 años: A criterio del profesional tratante
- Niños de 2 a 5 años: 1 mL cada 6 horas
- Niños de 6 a 11 años: 2 mL cada 6 horas
- Niños de 12 años y adolescentes: 4 mL cada 6 horas



UN MUNDO DE CALIDAD

CORISAN



CORISAN. COMPOSICIÓN.

- Amantadina HCl50 mg
- Acetaminofén300 mg
- Fenilefrina HCl.....5 mg
- Clorfeniramina maleato3 mg
- Cafeína anhidra50 mg
- Excipientes c.s.p..... 1 cápsula

INDICACIONES.

- Antiviral.
- Tratamiento de la gripe.
- Tratamiento del catarro nasal o coriza.
- Tratamiento sintomático de la influenza.

POSOLOGÍA

- Mayores de 12 años y adultos: 1 cápsula cada 8 horas.



CORISAN NOCHE. COMPOSICIÓN.

- Acetaminofén300 mg
- Amantadina HCl50 mg
- Clorfeniramina maleato3 mg
- Excipientes c.s.p..... 1 cápsula

INDICACIONES.

- Antiviral.
- Tratamiento de la gripe.
- Tratamiento del catarro nasal o coriza.
- Tratamiento sintomático de la influenza.

POSOLOGÍA.

- Mayores de 12 años y adultos: 1 cápsula cada 8 horas.

RESPIRATORIOS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: si ocurre somnolencia, no maneje automóvil ni máquinas peligrosas. Durante el tratamiento con CORISAN noche, no se debe dejar al alcance de los niños. Pacientes mayores de 60 años utilizar CORISAN noche solo por consejo o supervisión de un profesional de la salud.



UN MUNDO DE CALIDAD

CORISAN



CORISAN. COMPOSICIÓN.

- Amantadina clorhidrato 50 mg
- Paracetamol 160 mg
- Fenilefrina clorhidrato 2,5 mg
- Clorfeniramina maleato 1 mg
- Vehículo c.s.p 5 mL

INDICACIONES.

- Tratamiento de la gripe, catarro nasal o coriza.
- Tratamiento sintomático de la influenza.

POSOLOGÍA.

- Niños mayores de 2 años: 1 cdta cada 12 horas.
- Mayores de 12 años: 1 cdta cada 8 horas.
- Adultos: 2 cdts cada 12 horas.



CORISAN-N. COMPOSICIÓN.

- Amantadina HCl 20 mg
- Paracetamol 150 mg
- Clorfeniramina maleato 1,25 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Antiviral
- Analgésico
- Antipirético
- Antihistamínico

POSOLOGÍA.

- Menores de 2 años: a criterio del profesional tratante.
- Mayores de 2 años: 2 gotas/kg /dosis cada 6 horas.

RESPIRATORIOS



DOPRESOL

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Prednisolona (Fosfato sódico) equivalente a Prednisolona base.....3 mg
- Vehículo c.s.p.....1 mL

INDICACIONES.

- Dermatitis atópica, dermatitis por contacto, asma, rinitis alérgica y alergia a medicamentos.

POSOLÓGIA.

- Niños: 0,5 - 2 mg / kg / día
- Adultos: de 5 mg a 60 mg / día.



COMPOSICIÓN.

- Prednisolona (Fosfato sódico) equivalente a Prednisolona base.....3 mg
- Vehículo c.s.p.....1 mL

INDICACIONES.

- Dermatitis atópica, dermatitis por contacto, asma, rinitis alérgica y alergia a medicamentos.

POSOLÓGIA.

- Pediátrica: 0,5 - 2 mg / Kg / día



UN MUNDO DE CALIDAD

FEBRIN

RESPIRATORIOS



SUSPENSIÓN

COMPOSICIÓN.

- Ibuprofeno 20 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Analgésico.
- Antipirético.
- Antiinflamatorio.

POSOLOGÍA.

Peso (Kg)	Edad	Dosis (mL)
6 - 8	6 - 11 meses	3
9 - 11	12 - 23 meses	4
12 - 16	2 - 3 años	5
17 - 22	4 - 5 años	8
23 - 27	6 - 8 años	10
28 - 33	9 - 10 años	13
34 - 44	11 años	15

Si es necesario, repetir la dosis cada 6-8 horas.
No utilizar este producto más de 4 veces al día.



NUEVA
IMAGEN



UN MUNDO DE CALIDAD

FISIONASAL

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Sodio cloruro.....0,9 g
- Agua purificada c.s.p..... 100 mL

INDICACIONES.

- Disolvente del moco nasal.
- Descongestionante nasal.

POSOLOGÍA.

- Lactantes:
Instilar 2 gotas, 3 a 4 veces al día, en cada fosa nasal.
- Mayores de 2 años:
Instilar 2 gotas, 4 a 6 veces al día, en cada fosa nasal.



COMPOSICIÓN.

- Sodio cloruro.....0,9 g
- Agua Purificada c.s.p..... 100 mL

INDICACIONES.

- Disolvente del moco nasal.
- Descongestionante nasal.

POSOLOGÍA.

- Lactantes: Aplicar 2 atomizaciones, 3 a 4 veces al día, en cada fosa nasal.
- Mayores de 2 años: Aplicar 2 atomizaciones, 4 a 6 veces al día, en cada fosa nasal.



UN MUNDO DE CALIDAD

FLOGOBRON-S

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Clorfeniramina maleato.....0,5 mg/mL
- Fenilefrina HCl.....1,25 mg/mL
- Vehículo c.s.p.....1 mL

INDICACIONES.

- Utilizado como descongestionante nasal y antihistamínico. En congestión nasal, fiebre del heno, estornudos, tos, rinorreas, sinusitis, escozor, alergia al polen.

POSOLOGÍA.

- Niños de 3-5 años, 2 mL cada 6 a 8 horas
- Niños de 6-11 años, 4 mL cada 6 a 8 horas
- Niños de 12 años y adultos, 8 mL cada 6 a 8 horas



PRODUCTO
NUEVO



UN MUNDO DE CALIDAD

INFARUP

RESPIRATORIOS



SOLUCIÓN

COMPOSICIÓN.

- Rupatadina5 mg
- Excipientes c.s.p.....5 mL

INDICACIONES.

- Tratamiento sintomático de: Rinitis alérgica, incluyendo rinitis alérgica persistente.
- Urticaria espontánea/idiopática crónica.

POSOLÓGIA.

- Niños de 2-11 años (10-25 kg): 2,5 mL, una vez al día.
- Niños mayores a 11 años (más de 25 kg): 5 mL, una vez al día.



TABLETAS

COMPOSICIÓN.

- Rupatadina (como Rupatadina fumarato) 10 mg
- Excipientes c.s.p..... 1 tableta

INDICACIONES.

- Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y urticaria en adultos y adolescentes (mayores de 12 años).

POSOLÓGIA.

- Mayores de 12 años y adultos, 1 tableta 1 vez al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

LEVINFAR

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Levodropropizina..... 6 mg
- Vehículo c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES.

- Tratamiento de la tos no productiva irritativa o nerviosa en niños, adolescentes y adultos.

POSOLOGÍA.

- Menores de 2 años: A criterio del profesional tratante.
- Niños de 2 a 6 Años: 1 mg/kg cada 6-8 horas.
- Niños mayores de 6 años
 - De 10-15 Kg: 2,5 mL
 - De 16-20 Kg: 3 mL
 - De 21-30 Kg: 5 mL
 - Cada 6-8 horas.
- Adolescentes
 - De 31-45 Kg: 7,5 mL
 - Más de 45 Kg: 10 mL
 - Cada 6-8 horas.
- Adultos 10 mL cada 6-8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

MUCISOL



COMPOSICIÓN.

- Ambroxol HCl3 mg
- Vehículo edulcorado c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Afecciones de las vías pulmonares que cursan con sobreproducción de moco, tales como bronquitis, bronquiectasias, sinusitis, neumonía, asma y atelectacia.

POSOLÓGIA.

- Niños hasta 2 años: 1/2 cdta, 2 veces al día
- Niños de 2-5 años: 1/2 cdta, 3 veces al día
- Niños de 5-12 años: 1 cdta, 3 veces al día
- Más de 12 años y adultos: 1 a 2 cdtas, 3 veces al día



COMPOSICIÓN.

- Ambroxol HCl7,5 mg
- Vehículo edulcorado c.s.p. 1 mL

INDICACIONES.

- Mucolítico
- Expectorante

POSOLÓGIA.

- Niños hasta 2 años: 15-25 gotas, 2 veces al día
- Niños mayores de 2 años: 25-50 gotas, 2 veces al día

RESPIRATORIOS



UN MUNDO DE CALIDAD

MUCISOL COMPUESTO

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Ambroxol HCl 1,5 mg
- Clenbuterol HCL 1 mcg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Mucolítico • Broncodilatador • Aumento de la actividad de las células secretolíticas del tracto respiratorio.

POSOLÓGIA.

Edad	Dosis	Frecuencia
Hasta 8 meses	1/2 cucharadita	2 veces al día
8 meses a 2 años	1 cucharadita	2 veces al día
Niños de 2 a 4 años	1 1/2 cucharadita	2 veces al día
Niños de 4 a 6 años	2 cucharaditas	2 veces al día
Niños de 6 a 12 años	3 cucharaditas	2 veces al día
Mayores de 12 y adultos	4 cucharaditas	2 veces al día



COMPOSICIÓN.

- Ambroxol HCl 7,5 mg
- Clenbuterol HCL 5 mcg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Mucolítico • Broncodilatador • Aumento de la actividad de las células secretolíticas del tracto respiratorio.

POSOLÓGIA.

- Recién nacidos y niños menores de 3 años:
2 gotas/Kg de peso cada 12 horas.



UN MUNDO DE CALIDAD

PENTATOX

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Oxolamina Citrato..... 10 mg
- Guaifenesina..... 10 mg
- Difenhidramina HCl 1,2 mg
- Vehículo c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES.

- Tos y molestias asociadas al resfriado común (rinorrea y estornudos).
- Afecciones inflamatorias de las vías respiratorias.
- Bronquitis aguda.

POSOLÓGIA.

- Menores de 2 años: 1/2 cdtá, cada 6 horas.
- Niños de 2 a 10 años: 1 o 2 cdtas, cada 6 horas.
- Adultos: 1 cucharada, cada 6 horas.



PEREBRON



COMPOSICIÓN.

- Oxolamina citrato50 mg
- Guayacolato de Glicerilo50 mg
- Difenhidramina HCl6 mg
- Vehículo c.s.p5 mL

INDICACIONES.

- Tos del resfriado común
- Irritaciones tusígenas en las afecciones inflamatorias de las vías respiratorias.
- Bronquitis aguda.
- Tos del fumador.

POSOLÓGIA.

- Menores de 2 años: 1/2 cucharada, cada 4 a 6 horas.
- Niños de 2 a 10 años: 1 a 2 cdtas, cada 4 o 6 horas.
- Adultos: 1 cucharada cada 4 o 6 horas.

RESPIRATORIOS



UN MUNDO DE CALIDAD

PRILON



SOLUCIÓN

COMPOSICIÓN.

- Clorfeniramina, maleato0,4 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL
(2 mg = 5 mL)

INDICACIONES.

- Manifestaciones alérgicas
- Urticaria
- Alivio sintomático de reacciones alérgicas, dermatitis alérgica, rinitis y conjuntivitis.

POSOLÓGIA.

6 a 12 años de ½ a 1 cucharada, 3 veces al día. Mayores de 12 años, de 1 a 2 cdtas 3 o 4 veces al día. Mayores de 12 años, 2 cdtas 3 veces al día.



GOTAS

COMPOSICIÓN.

- Clorfeniramina, maleato1 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL
- 1 mL = 18 gotas

INDICACIONES

- Manifestaciones alérgicas
- Urticaria
- Alivio sintomático de reacciones alérgicas, dermatitis alérgica, rinitis y conjuntivitis.

POSOLÓGIA.

- Niños menores de 2 años:
2 gotas / Kg/ dosis cada 4-6 horas.

RESPIRATORIOS



UN MUNDO DE CALIDAD

ZINPARIN

RESPIRATORIOS



COMPOSICIÓN.

- Azitromicina (como dihidrato)200 mg
- Excipientes c.s.p.....5 ml

INDICACIONES

- Tratamiento de infecciones causadas por agentes bacterianos tales como: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.
- Vías respiratorias altas: faringitis, amigdalitis, otitis.
- Enfermedades de transmisión sexual no complicadas:
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae.

POSOLÓGIA.

- 10 mg / Kg peso corporal, 1 vez al día por 3 a 5 días.



UN MUNDO DE CALIDAD



ÍNDICE ÓTICO

Cerumsol	42
Ciproctil	43
Ciproctil Plus.....	44
Otogen	45
Otomic.....	46
Otoseptil.....	47



CERUMSOL

ÓTICO



COMPOSICIÓN.

- Peróxido de carbamida.....65 mg
- Vehículo c.s.p.....1 mL

INDICACIONES.

- Suavizador y removedor de la cera del oído

POSOLOGÍA.

- Niños menores de 12 años:
consultar al profesional tratante.
- Mayores de 12 años y adultos:
5 a 10 gotas, 2 veces al día durante 4 días.



UN MUNDO DE CALIDAD

CIPROCTIL

ÓTICO



COMPOSICIÓN.

- Ciprofloxacina base 3 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Tratamiento de otitis aguda externa, producida por bacterias sensibles a ciprofloxacina.

POSOLOGÍA.

- Niños de 1 a 12 años: instilar 3 gotas en el conducto auditivo, 2 veces al día por 7 días.
- Adultos: Instilar 4 gotas conducto auditivo 2 veces al día por 7 días.



UN MUNDO DE CALIDAD

CIPROCTIL PLUS



COMPOSICIÓN.

Cada mL contiene:

- Ciprofloxacino base.....3,0 mg
Equivalente a 3,49 mg de Ciprofloxacino clorhidrato
- Fluocinolona acetónido.....0,25 mg
- Vehículos c.s.p.....1 mL

INDICACIONES.

- Tratamiento de otitis aguda externa, producida por bacterias sensibles a ciprofloxacino u otitis media aguda con tubos de timpanostomía (OMAT), en niños mayores de 6 meses, adolescentes y adultos.

POSOLÓGIA.

- Mayores de 6 meses, adolescentes y adultos: Aplicar 6-8 gotas en el oído, cada 12 horas por 7 días.



OTOGEN

ÓTICO



COMPOSICIÓN.

- Benzalconio cloruro..... 1 mg
- Benzocaína HCl20 mg
- Vehículo c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES.

- Anestésico local y antiséptico, en dolores del oído.

POSOLOGÍA.

- Niños: 2 a 4 gotas en oídos, 4 veces al día.
- Adultos: 6 a 8 gotas en oídos, 4 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

OTOMIC

ÓTICO



COMPOSICIÓN.

- Miconazol nitrato.....20 mg
- Ácido acético.....0,02 mL
- Vehículo c.s.p. 1mL

INDICACIONES.

- Micosis del conducto auditivo externo causadas por hongos *Aspergillus* y levaduras como *Candida albicans*.

POSOLÓGIA.

- De 6 a 24 meses según indicación del profesional tratante.
- Niños de 2 años en adelante hasta adultos: 4 gotas en el conducto auditivo 2 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

OTOSEPTIL

ÓTICO



COMPOSICIÓN.

- Gentamicina sulfato 5,1 mg
- Dexametasona fosfato..... 1 mg
- Benzocaína HCL 20 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Otitis externa
- Inflamación del conducto auditivo externo.

POSOLÓGIA.

- Niños: 1 a 2 gotas en oídos, 3 veces al día.
- Adultos: 3 a 4 gotas en oídos, 3 veces al día.




UN MUNDO DE CALIDAD

ÍNDICE OTROS



Bocasec	49
Bomtonic-SD	50
Colchicina.....	51
Dovenal	52
Ferrikyn.....	53
Ferrikyn.....	54
Kalium.....	55
Mixotone-3.....	56
Molinux	57
Pasivalex.....	58
Piralgin	59
Trivikids.....	60
Vitamina C	61



BOCASEC

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Xilitol, 4 %

INDICACIONES.

• Se utiliza BOCASEC, en el síndrome de la boca seca, en pacientes de edad avanzada, durante la postmenopausia en mujeres adultas, personas adultas polimedicadas, personas que son sometidas a tratamientos con Radio o con quimioterapia. También se recomienda usar BOCASEC en el síndrome de Sjögren.

POSOLOGÍA.

• Aplicar BOCASEC en la cavidad bucal de dos a tres atomizaciones, cuando lo considere necesario o cada 4 horas.

PRECAUCIÓN. NO ingerir líquidos ni alimentos sino hasta 15 minutos después de cada atomización con BOCASEC.



Con sabor a menta



PRODUCTO
NUEVO



UN MUNDO DE CALIDAD

BOMTONIC-SD



SUPLEMENTO ALIMENTICIO CON CARNITINA, ASPARTATOS Y VITAMINA B6.

COMPOSICIÓN.

- Ácido Acetil Aspártico7 mg
- N-acetil glutamina5 mg
- Aspartato de magnesio40 mg
- Aspartato de potasio10 mg
- Carnitina HCl20 mg
- Vitamina B62,5 mg
- Vehículo saborizado c.s.p1 mL

POSOLÓGIA.

- Sachets: mayores de 12 años y adultos: un sobre 2 veces al día.
- Solución: mayores de 12 años y adultos 1 cda 2 veces al día.

OTROS



UN MUNDO DE CALIDAD

COLCHICINA

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Colchicina.....0,5 mg
- Vehículo c.s.p.....1 cápsula

INDICACIONES.

- En ataques artríticos gotosos.
- En tratamiento profiláctico de la gota.

POSOLÓGIA.

- Ataques agudos: 2 cápsulas 3 veces al día.
- Mantenimiento: 1 o 2 cápsulas al día.
- Profilaxis: 1 cápsula 3 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

DOVENAL

OTROS



CÁPSULAS

COMPOSICIÓN.

- Dobesilato de calcio 500 mg
- Vehículo c.s.p 1 cápsula

INDICACIONES.

- Desórdenes de la circulación periférica (edema, calambres, dermatosis), Coadyuvante en tromboflebitis, Síndrome post-trombótico, Trastornos arterovenosos, Retinopatía diabética.

POSOLOGÍA.

- Adultos: 1 cápsula, 2 veces al día.
- Retinopatía diabética: 1 cápsula, 3 veces al día.



GEL

COMPOSICIÓN.

- Dobesilato de calcio 2 g
- Vehículo c.s.p 100 g

INDICACIONES.

- Insuficiencia venosa.
- Dolor de piernas.
- Pesadez.
- Calambres.
- Hemorroides externas.

POSOLOGÍA.

- Aplique en la zona afectada 2 o 3 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

FERRIKYN



COMPOSICIÓN.

- Hierro elemental..... 10 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL

INDICACIONES.

- Prevención y tratamiento de anemias por deficiencia de hierro.

POSOLÓGÍA.

- Niños: 1/2 a 1 cucharada 1 a 2 veces al día.
- Adultos: 1 cdta 2 a 3 veces al día.



COMPOSICIÓN.

- Polisacarato de Hierro..... 111,85 mg aportando 50 mg de Hierro elemental
 - Vehículo c.s.p 1 mL
- Hierro elemental 1 gota = 2,5 mg

INDICACIONES.

- Prevención y tratamiento de anemias por deficiencia de hierro.

POSOLÓGÍA.

- Niños a partir de 2 meses de edad:
 - Profilaxis 1 gota/Kg de peso/día.
 - Tratamiento 2 gotas/Kg de peso/día.

OTROS



UN MUNDO DE CALIDAD

FERRIKYN

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Polisacarato de Hierro..... 134,23 mg aportando 60 mg de Hierro elemental.
- Acido Fólico..... 1000 mcg
- Excipientes c.s.p..... 1 cápsula

INDICACIONES.

- Suplemento de hierro y ácido fólico.

POSOLÓGIA.

- Niños mayores de 12 años: 1 cápsula una vez al día.
- Adultos: 1 cápsula 1 a 2 veces al día.



UN MUNDO DE CALIDAD

KALIUM

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Potasio gluconato.....312mg
- Vehículo c.s.p..... 1 mL
(15 mL contienen 20 meq de potasio elemental)

INDICACIONES.

- Deficiencia de potasio y pérdida de electrolitos.

POSOLÓGÍA.

- Niños: 1,5 mL/Kg de peso/día
- Adultos: de 30 a 60 mL al día



UN MUNDO DE CALIDAD

MIXOTONE-3

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Miconazol nitrato.....4 g
- Vehículo..... 100 g

INDICACIONES.

- Infecciones vulvovaginales producidas por levaduras del género Candida spp. y otros hongos

POSOLOGÍA.

- Enrosque el aplicador al tubo y llénelo con MIXOTONE (5 g)
- Inserte muy cuidadosamente el aplicador y deposite su contenido en lo profundo de la vagina y deseche el aplicador.
- Aplicar al acostarse durante 3 días.
- Contiene tres aplicadores.



UN MUNDO DE CALIDAD

MONILEX



COMPOSICIÓN.

- Benzalconio Cloruro 1 mg
- Lidocaína HCl 20 mg
- Vehículo y aroma c.s.p 1mL

INDICACIONES.

- Tratamiento de aftas.
- Estomatitis.
- Ulceración de la mucosa bucal.
- Coadyuvante en el tratamiento de infecciones bucales.

POSOLOGÍA.

- Aplicar cada 3 horas sobre la zona afectada.

OTROS



UN MUNDO DE CALIDAD

PASIVALEX



COMPOSICIÓN.

- Extracto hidroalcohólico seco de Passiflora incarnata L..... 25 mg
- Extracto hidroalcohólico seco de Valeriana officinalis L..... 27 mg
- Vehículo c.s.p..... 1 mL

INDICACIONES.

- Coadyuvante para el alivio del nerviosismo y los trastornos del sueño como el insomnio.

POSOLOGÍA.

- En alivio del nerviosismo de 5 mL a 10 mL de 2 a 3 veces al día, en insomnio de 15mL a 30mL 1 hora antes de acostarse.



COMPOSICIÓN.

- Valeriana officinalis 202,5 mg
- Pasiflora incarnata (extracto seco) 187,5 mg

INDICACIONES.

- El tratamiento de los trastornos nerviosos leves, síndrome de ansiedad. Auxiliar en casos de insomnio o dificultad para conciliar en sueño. Se utiliza también en casos de fatiga muscular (contracturas musculares, migraña de origen psicótico o ansiolítico)

POSOLOGÍA.

- Mayores de 12 años y adultos:
- Alivio de la ansiedad: 2 cápsulas, por la mañana, tarde y noche.
- Trastornos del sueño: dos cápsulas, media a hora antes de acostarse. No administrar más de seis cápsulas al día.

OTROS



PRODUCTO
NUEVO



UN MUNDO DE CALIDAD

PIRALGIN



COMPOSICIÓN.

- Diclofenáco (ácido libre).....9 mg/5 mL

INDICACIONES.

- Analgésico • Antipirético • Antiinflamatorio.

POSOLOGÍA.

- Niños: a partir de los 6 meses de edad: 0,15-0,5 mL / kg de peso; cada 8 horas.
- Mayores de 14 años: 12,5 a 25 mL, cada 8 horas

No debe sobrepasar la dosis máxima diaria de 150 mg.

OTROS



PRODUCTO
NUEVO



Con sabor a fresa-cereza



UN MUNDO DE CALIDAD

TRIVIKIDS

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Vitamina A (palmitato de retinilo)... 30 mg / mL
- Vitamina D (colecalférol) 480 U.I./mL
- Vitamina C (ácido ascórbico)..... 1800 U.I./mL

INDICACIONES.

- Suplemento alimenticio con las vitaminas esenciales, A, C, D. De primera elección en deficiencias vitamínicas (raquitismo, queratosis, afecciones respiratorias, regeneración de epitelios

POSOLÓGIA.

- 0-6 meses; 1-1,5 mL; 1 vez al día.
- 7-12 meses; 1,5 mL; 1 vez al día.
- 1-3 años; 1,5 mL; 1 vez al día.
- 4-6 años; 2 mL; 1 vez al día

PRODUCTO
NUEVO



UN MUNDO DE CALIDAD

VITAMINA C

OTROS



COMPOSICIÓN.

- Ácido ascórbico..... 100 mg
- Vehículo c.s.p 1 mL
1 mL = 20 gotas = 100 mg

INDICACIONES.

- Estados carenciales de vitamina C.

POSOLÓGIA.

- Niños menores de 12 años: según criterio del profesional tratante.
- Adolescentes y adultos: 6 a 20 gotas, 1 vez al día.



A close-up photograph of a female scientist in a white lab coat and blue gloves, looking through the eyepiece of a white microscope. The background is softly blurred, showing other lab coats. The text 'TABLAS DE REFERENCIA' is overlaid in the center-right of the image.

TABLAS DE REFERENCIA

ÍNDICE DE MASA CORPORAL



$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso (Kg)}}{[\text{Talla (m)}]^2}$$

Menos de 15	Delgadez pronunciada	Alto
De 15 a 20	Bajo o delgadez	Bajo
De 20 a 25	Normal	Peso saludable
De 25 a 30	Sobrepeso	Moderado
De 30 a 35	Obesidad grado I	Alto
De 35 a 40	Obesidad grado II	Muy Alto
Más de 41	Obesidad grado III	Extremo

PESO / TALLA

MUJERES	PESO			TALLA		
	Baja	Promedio	Alta	Baja	Promedio	Alta
Al nacer	2.800	3.220	3.850	46.4	49.5	51.6
1 mes	3.460	3.900	4.600	50.4	53.3	55.8
2 meses	4.250	4.72	5.440	54.0	56.4	59.4
3 meses	5.000	5.585	6.225	57.0	59.4	62.0
4 meses	5.560	6.210	7.000	59.6	62.0	64.7
5 meses	6.125	6.810	7.650	61.7	64.1	67.0
6 meses	6.625	7.340	8.225	63.5	66.0	69.0
7 meses	7.000	7.800	8.700	65.2	67.6	71.0
8 meses	7.400	8.190	9.125	66.7	69.4	72.5
9 meses	7.770	8.600	9.525	68.0	70.7	73.9
10 meses	8.100	8.950	9.925	69.4	72.0	75.3
11 meses	8.420	9.250	10.350	70.5	73.2	76.6
12 meses	8.690	9.600	10.730	71.6	74.4	77.8
15 meses	9.380	10.400	11.550	74.7	77.5	81.2
18 meses	10.000	11.080	12.275	77.4	80.6	84.1
21 meses	10.595	11.725	12.970	79.8	83.3	86.9
2 años	11.130	12.280	13.585	82.0	85.7	89.6
3 años	13.000	14.250	16.190	89.8	94.1	98.8
4 años	14.750	16.240	18.800	96.6	101.2	106.2
5 años	16.400	18.250	21.205	102.3	107.3	112.8
6 años	18.100	20.330	23.940	107.8	113.2	119.0
7 años	19.985	22.625	27.160	113.0	118.9	125.3
8 años	22.130	25.350	30.800	118.2	124.6	131.4
9 años	24.525	28.340	35.025	123.5	130.4	137.7
10 años	27.350	32.070	40.140	129.0	136.1	144.0
11 años	30.950	37.300	46.750	135.2	142.6	151.0
12 años	35.900	44.150	54.080	141.2	149.0	157.7
13 años	41.700	49.250	59.630	146.1	153.9	162.3
14 años	45.900	52.850	62.900	149.3	157.1	165.2
15 años	47.575	54.850	64.300	150.0	158.3	166.4
16 años	47.750	55.850	64.770	150.4	159.0	167.0
17 años	47.750	56.090	64.800	151.0	159.4	167.6
18 años	47.850	56.100	64.900	151.5	159.8	168.0

HOMBRES	PESO			TALLA		
	Baja	Promedio	Alta	Baja	Promedio	Alta
Al nacer	2.960	3.400	3.950	47.6	50.7	53.7
1 mes	3.665	4.200	4.890	51.8	54.2	57.3
2 meses	4.500	5.115	5.820	55.1	57.8	60.4
3 meses	5.200	5.970	6.800	58.1	60.8	63.2
4 meses	5.850	6.650	7.500	60.6	63.5	65.9
5 meses	6.420	7.235	8.100	63.1	66.0	68.3
6 meses	6.900	7.750	8.670	65.2	67.9	70.3
7 meses	7.325	8.200	9.210	66.7	69.4	71.9
8 meses	7.730	8.600	9.700	68.1	70.8	73.5
9 meses	8.125	9.000	10.130	69.4	72.1	74.8
10 meses	8.430	9.390	10.530	70.6	73.5	76.2
11 meses	8.730	9.700	10.880	71.9	74.7	77.3
12 meses	9.035	10.000	11.200	73.0	76.0	78.5
15 meses	9.750	10.725	12.060	76.0	79.0	82.4
18 meses	10.375	11.400	12.700	78.8	82.1	85.4
21 meses	10.890	12.000	13.415	81.4	84.8	88.1
2 años	11.360	12.550	14.035	83.7	87.0	90.8
3 años	13.110	14.560	16.360	91.1	95.1	98.8
4 años	14.760	16.490	18.620	97.5	101.6	105.5
5 años	16.410	18.460	21.000	103.1	107.5	112.3
6 años	18.090	20.670	23.580	108.8	113.5	118.6
7 años	19.940	23.140	26.700	114.0	119.2	124.7
8 años	22.100	25.750	30.190	119.3	125.0	131.0
9 años	24.360	28.700	34.200	124.0	130.1	136.8
10 años	26.925	31.850	38.725	128.4	135.3	142.1
11 años	29.735	35.375	43.890	133.0	140.3	148.0
12 años	33.050	39.775	50.215	137.4	145.8	154.1
13 años	36.950	45.010	57.510	143.0	152.3	161.5
14 años	41.950	51.100	64.280	150.3	159.6	168.4
15 años	48.000	58.090	68.700	156.7	165.6	174.0
16 años	52.800	62.930	71.800	161.2	169.7	178.3
17 años	54.540	65.115	73.850	163.3	172.0	180.4
18 años	54.960	66.000	75.000	163.8	172.5	181.5



UN MUNDO DE CALIDAD

UNIDADES DE MEDIDA



PESO

1 onza	28,35 gramos
1 libra (16onzas)	0,454 kilogramos
1 tonelada (2000 libras)	0,907 tonelada métrica

LÍQUIDOS

1 onza	29,57 mililitros
1 pinta (16onzas)	0,437 de litro
1/4 de galón (2 pintas)	0,946 de litro
1/4 galón (4 cuartos)	3,785 litros

MEDIDAS CÚBICAS

1 pie ³	0,028 de metro ³
1 yarda ³	0,765 de metro ³

MEDIDAS DE SUPERFICIE

1 pie ²	0,093 de metro ²
1 yarda ² (9 pies ²)	0,836 de metro ²
1 acre	0,405 de hectárea
1 milla ²	2,590 kilómetros ²

ESCALA DE TEMPERATURA

Celsius=	$(5/9) \times (\text{Fahrenheit} - 32)$
Fahrenheit=	$(9/5) \times (\text{Celsius} + 32)$


MEDIDAS LINEALES

1 pulgada	2,54 centímetros
1 pie (12 pulgadas)	30,48 centímetros
1 yarda (3 pies)	0,9144 de metro
1 milla (5,280 pies)	1,609 kilómetros





**INFARMA ES UN
LABORATORIO
FARMACÉUTICO
COMPROMETIDO
CON EL *medio
ambiente***




**PROGRAMA DE
RECOLECCIÓN DE
VIDRIO, CARTÓN,
PLÁSTICO Y ALUMINIO**



DISMINUCIÓN DE EMISIONES



**ENERGÍA LIMPIA, MÁS DE
500 PANELES SOLARES**



UN MUNDO DE CALIDAD

